

Mycotoxins?

Toxo Liquid[®]

Toxin Binder & Deactivator

100 mL

500 mL

1 Liter

**Bind & neutralize toxin effectively
& corrects liver rapidly**



এ্যামাইনো এসিড

লিভার কোষকে পুনর্গঠন
করে এবং দৈহিক বৃদ্ধি
নিশ্চিত করে

ইস্ট এক্সট্রাক্ট

টক্সিনকে পরিশোধন
এবং প্রশমিত করে

প্রোবায়োটিক

ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার
কলোনি প্রতিরোধ করে এবং
উপকারী ব্যাকটেরিয়ার
সংখ্যা বাড়ায়

Toxo Liquid®

Toxin Binder & Deactivator

অর্গানিক এসিড

ক্ষতিকর ফাঙ্গাস এবং
ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীর
ধ্বংস করে

Composition

Each 100 mL contains	
Yeast extracts	1x10 ⁸ CFU
Saccharomyces Cerevisiae	4.125x10 ⁷ CFU
Citric acid	8%
Ortho phosphoric acid	6%
Lactic acid	5%
Inactivated Yeast	5%
Amino acids	5%
(DL Methionine, Lysine, Threonine)	
Propylene glycol (Stabilizer)	QS

Indication

It works against Mycotoxicosis caused by Aspergillus, Fusarium & Penicillium etc

Benefits

- Effectively neutralizes toxins in the gut
- Helps to minimize the adverse effect of the toxic metabolites produced during metabolism
- Helps to control pathogenic bacteria & their toxic effects in the gut
- Improves Immunity
- Improves growth & productivity in poultry

Dosage & Administration

1mL/2-4 Liters of drinking water for 3-5 days.

Side Effect

It has no side effect at recommended dose.

Drug Interaction

Toxo Liquid does not interfere with the activity of other antibiotics in case of Mycotoxicosis.

Storage condition

Store in a cool & dry place. Protect from light & moisture. Keep out of reach of children.

Pack size

100 mL, 500 mL & 1 Liter

উপাদান

প্রতি ১০০ মি.লি.তে আছে	
ইস্ট এক্সট্রাক্ট	১ X ১০ ^৮ সি এফ ইউ
স্যাকারোমাইসেস সেরেভিসি	৪.১২৫ X ১০ ^৭ সি এফ ইউ
সাইট্রিক এসিড	৮%
অর্থোফসফরিক এসিড	৬%
ল্যাকটিক এসিড	৫%
ইন এক্টিভেটেড ইস্ট	৫%
এ্যামাইনো এসিড	৫%
(ডি এল মিথিওনিন, লাইসিন, থ্রিওনিন)	
প্রোপাইলিন গ্লাইকোল (স্টাবিলাইজার)	কিউ এস

নির্দেশনা

ইহা এসপারজিলাস, ফুসারিয়াম, পেনিসিলিয়াম দ্বারা সৃষ্ট মাইকোটক্সিকোসিস এর বিরুদ্ধে কার্যকর

টক্সো লিকুইড কেন ব্যবহার করবেন?

- অন্ত্রের টক্সিন কে কার্যকরীভাবে প্রশমিত করে
- মেটাবলিজমের ফলে সৃষ্ট টক্সিনের ক্ষতিকর প্রভাব কমায়
- অন্ত্রে রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট টক্সিনের ক্ষতিকর প্রভাব কমায়
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে
- পোস্তির দৈহিক বৃদ্ধি ও উৎপাদন বাড়ায়

মাত্রা ও প্রয়োগবিধি

১ মি.লি. ২-৪ লিটার খাবার পানিতে ৩-৫ দিন

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া

প্রস্তাবিত মাত্রায় এর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই।

ড্রাগ ইন্টারঅ্যাকশন

মাইকোটক্সিকোসিসের ক্ষেত্রে অন্যান্য এন্টিবায়োটিকের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করে না।

সংরক্ষণ

আলো থেকে দূরে, ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে রাখুন। সকল ঔষধ শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখুন।

প্যাক সাইজ

১০০ মি.লি., ৫০০ মি.লি. এবং ১ লিটার



Healthcare Formulations Limited

Animal Health Division

Dhaka, Bangladesh

