


# Henroquin<sup>®</sup> Vet

Enrofloxacin USP 100 mg/mL



**RUTHLESS ANTIBIOTIC** to treat  
**Respiratory, Renal & Digestive Infections**  
of poultry

# Henroquin Vet<sup>®</sup>

Enrofloxacin USP 100 mg/mL

**Ruthless antibiotic to treat respiratory, renal and digestive infections of poultry**

## COMPOSITION

Each mL contains Enrofloxacin USP 100 mg.

## MODE OF ACTION

Henroquin Vet<sup>®</sup> inhibits DNA gyrase enzyme which causes negative supercoiling of bacterial DNA, thus bacterial DNA replication, transcription and certain aspects of preparation and recombination inhibits.

## INDICATION

Effective against various gram positive and gram negative bacteria like Staphylococci, Streptococci, E. coli, Salmonella, Haemophilus, Klebsiella, Pasteurella, Bronchiseptica and Mycoplasma.

## DOSAGE AND ADMINISTRATION

**Poultry:** 1 mL/ 1-2 Liter of drinking water for 3-5 consecutive days (10 mg/ kg body weight).

Or, as directed by registered Veterinarian.

**Aquatic Animal:** 1-2 mL/ kg feed for 3-5 consecutive days (10 mg/ kg body weight)

In water 1 mL/ decimal for 3-5 consecutive days

On the basis of 01 feet water depth

Or, as directed by registered Veterinarian/ Aqua Consultant.

## COMMERCIAL PACKAGING

100 mL, 500 mL & 1 Liter

## উপাদান

প্রতি মি.লি. তে আছে- এনরোফ্লক্সাসিন ইউএসপি ১০০ মি.গ্রা.।

## কার্যপ্রণালী

হেনরোকুইন ভেট<sup>®</sup> ব্যাকটেরিয়ার ডি.এন.এ গাইরেজকে বাধা প্রদান করে যার ফলে ব্যাকটেরিয়ার ডি.এন.এ এর নেগেটিভ সুপারকয়েলিং ঘটে ফলশ্রুতিতে ব্যাকটেরিয়ার ডি.এন.এ এর রেপ্লিকেশন, ট্রান্সক্রিপশন এবং বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

## নির্দেশনা

হেনরোকুইন ভেট<sup>®</sup> পোল্ট্রির বিভিন্ন গ্রাম পজিটিভ ও গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া যেমন- স্টেফাইলোকক্কাই, স্ট্রেপটোকক্কাই, ই-কোলাই, সালমোনেলা, হিমোফিলাস, ক্রেবসিয়েলা, পাস্টুরেলা, ব্রুক্সিসেপ্টিকা এবং মাইকোপ্লাজমা এর বিরুদ্ধে অত্যন্ত কার্যকর।

## মাত্রা ও প্রয়োগবিধি

**পোল্ট্রি:** ১ মি.লি./ ১-২ লিটার খাবার পানিতে ৩-৫ দিন (১০ মি.গ্রা./ কেজি দৈনিক ওজনের জন্য)

অথবা, রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ান এর পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।

**জলজ প্রাণী:** ১-২ মি.লি./ কেজি খাদ্যে ৩-৫ দিন (১০ মি.গ্রা./ কেজি দৈনিক ওজনের জন্য)।

পানিতে ১ মি.লি./ শতাংশ। প্রতি ফুট গভীরতার জন্য ৩-৫ দিন।

অথবা রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ান/ অ্যাকুয়া কনসালট্যান্ট এর পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।

## বাণিজ্যিক মোড়ক

১০০ মি.লি., ৫০০ মি.লি. এবং ১ লিটার

## BIOAVAILABILITY (%)

Ciprofloxacin

60-75

Enrofloxacin

64-80



Manufactured for  
**Healthcare Pharmaceuticals Ltd.**  
by NAAFCO Pharma Ltd.  
Dhaka, Bangladesh



Marketed by  
**Healthcare Formulations Limited**  
Animal Health Division  
Dhaka, Bangladesh