



উকুনমুক্ত জলাশয়ের নিশ্চয়তায়

Riovera Vet[®]

Ivermectin BP 10 mg/mL



রিওভেরা ভেট®

আইভারমেকটিন বিপি ১০ মি.গ্রা./ মি.লি.



নির্দেশনা

- ▶ জলাশয়কে উকুন বা আরগুলাসসহ অন্যান্য পরজীবী হতে সুরক্ষা প্রদান করে।
- ▶ জলাশয় হতে পরজীবীর ডিম ও লার্ভা ধ্বংস করে।
- ▶ অন্তঃপরজীবী (গোল কৃমি) ও বহিঃপরজীবী (আঠালি, উকুন, মাইট, ফ্লি) এর বিরুদ্ধে কাজ করে।

মাত্রা ও প্রয়োগবিধি

জলাশয়:

প্রতিরোধ: ০.৫ মি.লি./ শতাংশ। প্রতি ফুট গভীরতার জন্য ২১ দিন পর পর শুধুমাত্র একবার ব্যবহার করতে হবে।

নিয়ন্ত্রণ: ১ মি.লি./ শতাংশ। প্রতি ফুট গভীরতার জন্য ৫-৭ দিন পর পর শুধুমাত্র ১-২ বার ব্যবহার করতে হবে।
ব্যবহারের পূর্বে ১ লিটার/ ২০-৩০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে সলিউশন তৈরী করতে হবে।

পোল্ট্রি: ওরাল ডোজ

অন্তঃপরজীবী: ১ মি.লি./ ২৫ কেজি ওজনের জন্য

(আইভারমেকটিন ০.৪ মি.গ্রা./ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য) ১ দিন। যদি প্রয়োজন হয় ১৫ দিন পর একই মাত্রায় আরো একবার প্রয়োগ করতে হবে।

বহিঃপরজীবী: ১ মি.লি./ ২৫ কেজি ওজনের জন্য

(আইভারমেকটিন ০.৪ মি.গ্রা./ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য) ২ দিন। যদি প্রয়োজন হয় ১৫ দিন পর একই মাত্রায় আরো একবার প্রয়োগ করতে হবে।

অথবা রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ান/ মৎস্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।

সরবরাহ

১০০ মি.লি., ৫০০ মি.লি. এবং ১ লিটার।

Pharmacology

Riovera Vet® solution have strong affinity to glutamate gated chloride ion channel of nerves and causes hyperpolarization of the nerve or muscles cells and resulting paralysis and killing of parasites. Ivermectin is metabolized in the liver.



Manufactured for
Healthcare Pharmaceuticals Ltd.
by NAAFCO Pharma Ltd.
Dhaka, Bangladesh



Marketed by
Healthcare Formulations Limited
Animal Health Division
Dhaka, Bangladesh