


Tiagard vet

Tiamulin Hydrogen Fumarate USP 45%

**COMPLETE CARE for
Respiratory Health
of Poultry**



Key Features

Targeted Antibacterial Action

Synergy with Other Antibiotics

Well Tolerated with Safety Margin

Strong Activity Against Mycoplasma

Good Absorption & Pharmacokinetics



Tiagard vet

Tiamulin Hydrogen Fumarate USP 45%

COMPOSITION

Each gram powder contains Tiamulin Hydrogen Fumarate USP 450 mg.

MODE OF ACTION

Tiamulin is usually a bacteriostatic antibiotic, but can be bactericidal in very high concentrations against susceptible organisms. The drug acts by binding to the 50S ribosomal subunit, thereby inhibiting bacterial protein synthesis.

INDICATION

Used for the treatment & prevention of Mycoplasmal and other infections of poultry like CRD, CCRD, Sinusitis, Airsacculitis, Enteritis & Pneumonia etc.

DOSE

Treatment:

In drinking water: 25-30 mg/ kg Body Weight or 1 g/ 2 L drinking water for 3-5 days

In feed: 30-40 g/ 100 kg feed for 5-7 days

Prevention:

In drinking water: 1 g/ 4 L drinking water for 1-7 days

In Feed: 20 g/ 100 kg feed for 3-5 days
Or, as directed by registered Veterinarian/ Consultant.

WITHDRAWAL PERIOD

For meat: 03 (three) days, **For egg:** Nil (Zero).

PACK SIZE

100 g sachet.

উপাদান

প্রতি গ্রাম পাউডারে আছে টিয়ামুলিন হাইড্রোজেন ফিউমারেট ইউএসপি ৪৫০ মি.গ্রা.।

কার্যপ্রণালী

টিয়ামুলিন মূলত একটি ব্যাকটেরিওস্ট্যাটিক এন্টিবায়োটিক, তবে উচ্চ মাত্রায় ব্যবহারের ফলে ইহা অণুজীবের বিরুদ্ধে ব্যাকটেরিওসাইডাল কার্যকারীতা প্রদর্শন করে। ড্রাগটি ৫০এস রাইবোজোমাল সাব ইউনিটের সাথে যুক্ত হয়ে ব্যাকটেরিয়ার প্রোটিন সংশ্লেষণ ব্যাহত করে।

ব্যবহারক্ষেত্র

ইহা মূলত পোল্ট্রির মাইকোপ্লাজমা জনিত সংক্রমণ এবং অন্যান্য সংক্রমণ জনিত রোগ যেমন সিআরডি, সিসিআরডি, সাইনুসাইটিস, এয়ার স্যাকুলাইটিস, এন্টেরাইটিস এবং নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার্য।

মাত্রা ও প্রয়োগবিধি

চিকিৎসায়

খাবার পানির সাথে: ২৫-৩০ মি.গ্রা./ কেজি দৈনিক ওজনের জন্য অথবা ১ গ্রাম/ ২ লিটার খাবার পানির সাথে ৩-৫ দিন

খাবারের সাথে: ৩০-৪০ গ্রাম/ ১০০ কেজি খাদ্যে ৫-৭ দিন

প্রতিরোধে

খাবার পানির সাথে: ১ গ্রাম/ ৪ লিটার খাবার পানির সাথে ১-৭ দিন

খাবারের সাথে: ২০ গ্রাম/ ১০০ কেজি খাদ্যে ৩-৫ দিন

অথবা রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ান/ কনসাল্ট্যান্ট এর পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।

প্রত্যাহারকাল

মাংসে: ৩ দিন, ডিমে: ০ দিন।

প্যাক সাইজ

১০০ গ্রাম স্যাশেট।

website: www.bdhfl.com



Manufactured by:
Healthcare Formulations Limited
Animal Health Division
Sreepur, Gazipur, Bangladesh

