HM Vet
Marbofloxacin BP 50 mg

HM DS Vet
Marbofloxacin BP 100 mg





Any Infections
Strong Solutions

KEY FEATURES

- Fast & Powerful Bacterial Control
- Broad-Spectrum Protection
- Deep Tissue Penetration
- Excellent Oral Bioavailability
- Low Dose, High Impact
- Proven Safety Profile

HF Formulations | Healthcare

HM Vet


Marbofloxacin BP 50 mg

HM DS Vet

Marbofloxacin BP 100 mg

MODE OF ACTION

It is a bactericidal drug, actively killing bacteria by inhibiting bacterial DNA gyrase and the topoisomerase IV enzyme, thereby inhibiting DNA replication and transcription.



কার্যপ্রণালী

এটি একটি ব্যাকটেরিসাইডাল এন্টিবায়োটিক যা সক্রিয়ভাবে ব্যাকটেরিয়াল ডি.এন.এ. গাইরেজ এনজাইম এবং টপোআইসোমারেজ ৪ এনজাইমকে বাধা প্রদানের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে।

COMPOSITION

HM Vet Bolus: Each HM Vet Bolus contains Marbofloxacin BP 50 mg.
HM DS Vet Bolus: Each HM DS Vet Bolus contains Marbofloxacin BP 100 mg.

INDICATIONS

It is indicated for the treatment of following diseases caused by both gram-positive, gram-negative bacteria and mycoplasma.

- Acute mastitis
- Diarrhoea and gastro-enteritis
- Severe respiratory infections
- Neonatal gastro-enteritis caused by *Escherichia coli*

DOSAGE AND ADMINISTRATION

HM Vet Bolus:
The recommended dose is 1 mg/ kg/ day for 3 consecutive days
Calves: 1 bolus/ 50 kg body weight for 3 consecutive days.
Dog/ Cat: 1 bolus/ 18 kg body weight (2.75 mg/ kg body weight) for 3 consecutive days.
HM DS Vet Bolus:
The recommended dose is 1 mg/ kg/ day for 3 consecutive days
Cattle: 1 bolus/ 100 kg body weight for 3 consecutive days.
Dog/ Cat: 1 bolus/ 36 kg body weight (2.75 mg/ kg body weight) for 3 consecutive days.
Or, as per direction of registered Veterinarian/ Consultant.

USE IN PREGNANCY AND LACTATION

It may be used safely during pregnancy and lactation.

WITHDRAWAL PERIOD

Meat: 6 days, **Milk:** 36 hours.

PACKAGING

HM Vet Bolus: Each carton contains 5 x 4 boli in Alu-Alu blister pack.
HM DS Vet Bolus: Each carton contains 3 x 4 boli in Alu-Alu blister pack.

উপাদান

এইচএম ভেট বোলাস: প্রতিটি এইচএম ভেট বোলাসে আছে মারবোফ্লক্সাসিন বিপি ৫০ মি.গ্রা.।
এইচএম ডিএস ভেট বোলাস: প্রতিটি এইচএম ডিএস ভেট বোলাসে আছে মারবোফ্লক্সাসিন বিপি ১০০ মি.গ্রা.।

নির্দেশনা

এটি গ্রাম-পজিটিভ, গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া ও মাইকোপ্লাজমা ঘটিত নিম্নলিখিত রোগের বিরুদ্ধে কার্যকর-

- প্রকট ওলান প্রদাহ
- ডায়রিয়া এবং পরিপাকতন্ত্রের প্রদাহ
- গুরুতর শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ
- ই কোলাই দ্বারা সৃষ্ট বাছুরের পরিপাকতন্ত্রের প্রদাহ

মাত্রা ও প্রয়োগবিধি

এইচএম ভেট বোলাস:
এইচএম ভেট বোলাস এর নির্দেশিত মাত্রা ১ মি.গ্রা./ কেজি/ দিন পরপর ৩ দিন।
বাছুর: ১ বোলাস/ ৫০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য পরপর ৩ দিন।
কুকুর/ বিড়াল: ১ বোলাস/ ১৮ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য (২.৭৫ মি.গ্রা./ কেজি দৈহিক ওজন) পরপর ৩ দিন।
এইচএম ডিএস ভেট বোলাস:
এইচএম ডিএস ভেট বোলাস এর নির্দেশিত মাত্রা ১ মি.গ্রা./ কেজি/ দিন পরপর ৩ দিন।
গরু: ১ বোলাস/ ১০০ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য পরপর ৩ দিন।
কুকুর/ বিড়াল: ১ বোলাস/৩৬ কেজি দৈহিক ওজনের জন্য (২.৭৫ মি.গ্রা./ কেজি দৈহিক ওজন) পরপর ৩ দিন।
অথবা, রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ান/ কনসালট্যান্ট এর পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।

গর্ভাবস্থায় ও দুগ্ধদানকালীন ব্যবহার

গর্ভাবস্থায় ও দুগ্ধদানকালে নিরাপদে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রত্যাহারকাল

মাংস: ৬ দিন, **দুধ:** ৩৬ ঘন্টা।

সরবরাহ

এইচএম ভেট বোলাস: প্রতিটি বাণিজ্যিক মোড়কে আছে ৫ x ৪ টি বোলাস, অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকে।
এইচএম ডিএস ভেট বোলাস: প্রতিটি বাণিজ্যিক মোড়কে আছে ৩ x ৪ টি বোলাস, অ্যালু-অ্যালু ব্লিস্টার প্যাকে।

Formulations
Manufactured by:
Healthcare Formulations Limited
Animal Health Division
Sreepur, Gazipur, Bangladesh

website: www.bdhfl.com

Healthcare

17042338/PE